

Erkrankung	Inkubationszeit	Wiederzulassung der erkrankten Person	Spezielle Maßnahmen
schwere Bindegautentzündung durch Adenoviren	5 – 12 Tage	14 Tage nach Beginn der Erkrankung; nur bei Adenoviren!!	Häufiges Händewaschen; Berührung der Augen vermeiden; Wäsche $\geq 60^{\circ}\text{C}$
Borkenflechte (Impetigo contagiosa)	1 – 3 Tage	24h nach Beginn Antibiotikatherapie, sonst nach Abheilung	Häufiges Händewaschen; Wäsche $\geq 60^{\circ}\text{C}$
Erkältungs-krankheiten mit Fieber ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) (auch Influenza, RSV, SARS-CoV-2)	1 – 12 Tage (je nach Erreger)	Mind. 24h fieberfrei, deutliche Besserung des Allgemeinzustandes	Häufiges Händewaschen; Häufiges Lüften; Hustenetiquette
Hand-Fuß-Mund	3 – 10 Tage	Nach vollständigem Verkrustung der Bläschen	Häufiges Händewaschen
Herpes	2 – 12 Tage	Kein Ausschluss	Möglichst keine Berührung der Läsionen
Keuchhusten (Pertussis)	meist 9 – 10 Tage (Spanne 6 – 20 Tage)	5 Tage nach Beginn der Antibiotikatherapie oder 21 Tage nach Beginn des Hustens, wenn keine antibiotische Behandlung durchgeführt wurde	Impfung!
Kopfläuse	keine Inkubationszeit	Nach der 1. Behandlung möglich	2. Behandlung nach 8 Tagen, Auskämmen mit Nissenkamm
Kräätze (Scabies)	Symptome nach 2 – 5 Wochen, bei Reinfektion nach 1 – 4 Tage	8h nach der 1. Behandlung mit Creme oder 24h nach Einnahme von Tabletten	Gleichzeitige Behandlung aller Familienmitglieder; bei Scabies crustosa Beratung durch GA
Magen-Darm-Erkrankungen (auch Noro-/Rotaviren, Salmonellen)	1 – 3 Tage; ggfs. länger	48h kein Erbrechen und kein Durchfall bei Kindern unter 6 Jahren	Impfung (Rotaviren); Lebensmittelhygiene; Häufiges Händewaschen; Wäsche/Geschirr $\geq 60^{\circ}\text{C}$
Masern	7 – 21 Tage	Am 5. Tag nach Auftreten des Exanthems	Impfung! Kontaktpersonen werden vom GA informiert
Meningokokken	3 – 4 Tage (Spanne 2 – 10 Tage)	24h nach Beginn der Antibiotikatherapie	Impfung! Kontaktpersonen werden vom GA informiert
Mumps	16 – 18 Tage (Spanne 12 – 25 Tage)	5 Tage nach Beginn der Symptome	Impfung! Kontaktpersonen werden vom GA informiert
Pfeifersches Drüsenfieber	1 – 6 Wochen	Kein grundsätzlicher Ausschluss; Besuch abhängig vom Allgemeinbefinden	Einmalige Erkrankung bietet lebenslangen Schutz
Ringelröteln	1 – 2 Wochen	Bei Auftreten des Hautausschlages	Einmalige Erkrankung bietet lebenslangen Schutz
Röteln	14 – 17 Tage (Spanne 14 – 21 Tage)	Nach Genesung und frühestens 8 Tage nach Beginn	Impfung! Kontaktpersonen werden vom GA informiert
Scharlach oder sonstige Streptokokken	1 – 3 Tage	24h nach Beginn Antibiotikatherapie und Besserung der Symptome, sonst 24h nach Genesung	Häufiges Händewaschen; Geschirr $\geq 60^{\circ}\text{C}$
Windpocken	14 – 16 Tage (Spanne 8 – 28 Tage)	Nach vollständigem Verkrustung der Bläschen	Impfung! Kontaktpersonen werden vom Gesundheitsamt informiert
Wurmerkrankungen		Kein Ausschluss	Häufiges Händewaschen; Fingernägel kurz schneiden; Wäsche $\geq 60^{\circ}\text{C}$

Grundsätzlich gilt: Akut kranke Kinder (Fieber $\geq 38^{\circ}\text{C}$, Abgeschlagenheit) gehören nicht in die KiTa/Kindertagespflege oder Schule